




Prise en charge précoce Améliorer l'organisation des soins

21 septembre 2012

70 000 personnes
atteintes d'IRCT

Combien de personnes
connues/suivies en stade 1 à 4 ?

3 millions d'adultes
seraient atteints
de MRC



Le dépistage, et après ?

- Confirmer le diagnostic ?
- Evolutivité ?
- Qui adresser en néphrologie ?
- Quand ?
- Quels messages
 - pour les professionnels ?
 - Pour les « dépistés »? (à partir de quand sont-ils des « malades »)

- **Lesquels ?**
 - Médecins généralistes
 - Autres spécialités (endocrino, cardio, uro...)
 - Paramédicaux
 - Les Réseaux,
 - Les Maisons de santé, etc...
- **La démographie des néphrologues**
- **La coopération interprofessionnelle**
- **Place des systèmes d'information/DMP**

- **Quand (qui) alerter ?**
 - Notion de risque rénal, d'évolutivité, de facteur de risque cardio-vasculaire...
 - algorithme de décision ?
- **L'éducation à la santé et l'éducation thérapeutique**
- **Le rôle d'internet et des réseaux sociaux**
- **Les programmes personnalisés de soins**
- **La prise en charge pluri-professionnelle**
- **.....**

Vers une politique homogène
de traitement et d'accompagnement
des personnes ayant une MRC

Les débats sont ouverts !